



**ALBERT EINSTEIN
HOSPITAL ISRAELITA**

**ROTINA GERENCIADA
DURAÇÃO DA TERAPIA ANTIMICROBIANA**

Versão eletrônica atualizada em
Fevereiro 2012

Objetivo: promover o uso racional de antimicrobianos por meio da duração adequada da terapia antimicrobiana.


Intervenção: avaliação do farmacêutico dos antimicrobianos prescritos com finalidade terapêutica, solicitando a interrupção do tratamento, nos pacientes elegíveis, após 14 dias de duração. Serão considerados pacientes elegíveis aqueles que preencherem os critérios de inclusão.

Critérios de inclusão	Critérios de exclusão
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pacientes internados em uso de antimicrobianos com finalidade terapêutica 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uso de antimicrobianos destinados à profilaxia cirúrgica ▪ Uso de antimicrobianos destinados à profilaxia de infecções bacterianas, virais ou fúngicas em pacientes imunossuprimidos (transplante de medula óssea, transplante de órgãos sólidos, doenças hematológicas, SIDA) ▪ Infecções cuja duração do tratamento seja superior a 14 dias: <ul style="list-style-type: none"> - endocardite bacteriana - meningite ou ventriculite após neurocirurgias ou na presença de derivações (DVE ou DVP) - infecções osteoarticulares: osteomielites, artrite séptica, infecções de próteses - infecções abdominais complicadas (abscessos, fístulas, etc)

Indicador:

Número de pacientes em que houve adesão ao protocolo / Número de pacientes elegíveis avaliados x 100

Fluxograma



*Infectologistas do SCIH (Dra Luci ou Dra Claudia) ou no CTI-A, Dr Alexandre Marra ou Dr Moacyr