




**ALBERT EINSTEIN**  
**HOSPITAL ISRAELITA**

## Diretrizes Assistenciais

### INDICADORES DE QUALIDADE FARMÁCIA CLÍNICA

---

Versão eletrônica atualizada em  
Junho – 2009




**Protocolo de Albumina:** Uso de albumina quando existe indicação formal ou discutível.

*Jun/09 – Adesão de 92,0% em 12 pacientes que receberam albumina.*

Indicações não fundamentadas:

1. Correção de hipoalbuminemia (níveis acima de 2,5g%)
2. Correção de perdas volêmicas agudas, incluindo choque hemorrágico
3. Tratamento de pacientes com cirrose hepática ou com síndrome nefrótica não descompensados



**Baixo Índice Terapêutico:** As drogas monitoradas são: vancomicina, gentamicina, amicacina, aminofilina, fenitoina, carbamazepina, fenobarbital, e ácido valpróico.

*JUN/09 – Adesão de 97,14% em 35 pacientes incluídos.*

**Antibiótico Profilaxia:** Suspensão de antibióticos profiláticos em até 48 horas.

*JUN/09 – Adesão de 71,10% em 346 antimicrobianos prescritos.*

**Antibiótico Terapêutico:** Suspensão do uso de antibióticos terapêuticos em até 14 dias.

*JUN/09 – Adesão de 92,00% em 300 antimicrobianos prescritos.*

**Crítérios de Exclusão:**

1. Uso de antimicrobianos destinados à profilaxia de infecções bacterianas, virais ou fúngicas em pacientes imunossuprimidos (transplante de medula óssea, transplante de órgãos sólidos, doenças hematológicas, SIDA)
2. Endocardite bacteriana, infecções osteoarticulares (osteomielites, artrite séptica, infecções de próteses)
3. Infecções abdominais complicadas (abscessos, fístulas, etc)