




ALBERT EINSTEIN
HOSPITAL ISRAELITA

Indicadores

Farmácia Clínica

Versão eletrônica atualizada em
Novembro - 2009




Protocolo de Albumina: Uso de albumina quando existe indicação formal ou discutível.

Out/09 – Adesão de 100,0% em 31 pacientes que receberam albumina.

Indicações não fundamentadas:

- i. Correção de hipoalbuminemia (níveis acima de 2,5g%)
- ii. Correção de perdas volêmicas agudas, incluindo choque hemorrágico
- iii. Tratamento de pacientes com cirrose hepática ou com síndrome nefrótica não descompensados



Baixo Índice Terapêutico: As drogas monitoradas são: vancomicina, gentamicina, amicacina, aminofilina, fenitoina, carbamazepina, fenobarbital, e ácido valpróico.

OUT/09 – Adesão de 100,00% em 41 pacientes incluídos.

Antibiótico Profilaxia: Suspensão de antibióticos profiláticos em até 48 horas.

OUT/09 – Adesão de 70,02% em 427 antimicrobianos prescritos.

Antibiótico Terapêutico: Suspensão do uso de antibióticos terapêuticos em até 14 dias.

OUT/09 – Adesão de 90,38% em 291 antimicrobianos prescritos.

Critérios de Exclusão:

1. Uso de antimicrobianos destinados à profilaxia de infecções bacterianas, virais ou fúngicas em pacientes imunossuprimidos (transplante de medula óssea, transplante de órgãos sólidos, doenças hematológicas, SIDA)
2. Endocardite bacteriana, infecções osteoarticulares (osteomielites, artrite séptica, infecções de próteses)
3. Infecções abdominais complicadas (abscessos, fístulas, etc).