



Política de Prescrição Médica orienta ações para maior segurança do paciente

A auditoria para a quarta reacreditação do Hospital Israelita Albert Einstein pela Joint Commission International acontecerá em março. Uma série de ações e procedimentos estão sendo reforçados com os profissionais como uma preparação para a avaliação. E entre esses procedimentos, a política de prescrição médica é de fundamental importância. Ela tem o objetivo de orientar os profissionais da Instituição – médicos, enfermeiros, farmacêuticos e profissionais administrativos – quanto ao processo de prescrição de medicamentos para garantir a segurança do paciente. A seguir, estão os principais pontos dessa política. A íntegra pode ser obtida no Medical Suite, no link <http://web.telaviva/home/prontuario/index>.



Para efetuar uma prescrição completa e aceitável, siga estas diretrizes:

Legibilidade – Prescrever com letra legível. Nos casos de dúvida em relação à legibilidade, o enfermeiro ou farmacêutico deve entrar em contato com o médico para se assegurar do item prescrito.

Identificação do paciente – Toda prescrição deve estar identificada com a etiqueta do paciente com, no mínimo, nome completo e número de prontuário.

Conteúdo da prescrição – Os campos obrigatórios são: Data, Horário, Medicamento, Dose, Via e Frequência. É fundamental respeitar as linhas do formulário e não prescrever no rodapé; além de prescrever sem rasuras e sem usar corretivos. Ao fazer qualquer alteração de via, frequência e dose, o item deverá ser suspenso e prescrito novamente no final do formulário. Toda inclusão, alteração ou suspensão deverá ter data, horário e identificação legível do médico. Deve-se prescrever sempre por dose, e não pela unidade de apresentação comercial do medicamento (ampola, comprimido, frasco). A informação sobre alergia do paciente a algum medicamento deve constar em todas as folhas da prescrição. Todas as informações de prescrição de medicamentos estão registradas no prontuário do paciente e deverão estar disponíveis também nos casos de transferência do paciente.

Uso de nomenclatura genérica e comercial – É aceita a prescrição com o nome do medicamento comercial ou do princípio ativo da droga.

Frequência de uso “se necessário” – A prescrição de medicamento “se necessário” deve ter descrita a indicação específica (ex: se dor, se febre, se náusea, se vômito, se dor ou febre, se prurido, se tremores, se convulsão, se diarreia). Colocar a frequência e/ ou dose máxima indicada para o medicamento prescrito.

Prescrição de fármacos com aparência, nome ou som parecidos – A Instituição possui, em todos os postos de enfermagem, uma lista de medicamentos com grafia e som parecidos. Nos casos de dúvida em relação à legibilidade, o enfermeiro ou farmacêutico deve entrar em contato com o médico para se assegurar do item prescrito.

Prescrições por ordem telefônica e verbal – As ordens telefônicas são reservadas para alterações, inclusões ou suspensões de itens. Ao receber a ordem telefônica, o profissional terá que escrever e ler de volta para o médico para que ele confirme a informação transmitida. Tais itens devem ser validados pessoalmente pelo médico em até 24h. Não é permitido realizar prescrição integral de admissão por ordem telefônica ou verbal. Não é permitida a prescrição por ordem telefônica de drogas vasoativas, trombolíticos, anestésicos, medicamentos de uso restrito e antineoplásicos.

Prescrições calculadas por peso

Pacientes pediátricos (até 18 anos): Na prescrição pediátrica, é indispensável indicar a dose/Kg/dia e a frequência de administração do medicamento. É necessário constar o peso do paciente em todas as folhas da prescrição.

Pacientes neonatais: Nas prescrições de pacientes neonatais, informar a dose por mg/kg e a frequência de administração do medicamento para idade gestacional ao nascimento, dias de vida pós-natal e intervalo diferente de dia (ex: Vancomicina 10mg/Kg/dose cada 18 horas para IG < 29 semanas, de 0–14 dias de vida).

Abreviações permitidas nas prescrições médicas

Sigla	Significado
AO	ambos os olhos
ACM	a critério médico
AP/amp	ampola
Cáp	cápsula(s)
Ca	cálcio
cm ³ /cc	centímetro cúbico
Col	colírio
CP/ comp	comprimido(s)
CR	creme
d	dia(s)
DG	drágeas
DI	Disco
ENV	envelope
EV	endovenoso
FAP	frasco(s) ampola
FL	flaconete (s)
FR	frasco (s)
g	grama(s)
Gt/gt	gota(s)
h	hora(s)
IM	intramuscular
IV	intravenoso
KCl	cloreto de potássio
Kg	quilograma(s)
L	litro(s)
m ²	metro(s) quadrado(s)
mcg	micrograma(s)
mEq	miliequivalente(s)
mg	miligrama(s)
Mg	magnésio
min	minuto(s)

Sigla	Significado
mL	mililitro(s)
mMol	milimol(es)
NaCl	cloreto de sódio
NPT	nutrição parenteral total
OT	ordem telefônica
OV	ordem verbal
qsp	quantidade suficiente para
PM	pomada
QT	quimioterapia
Seg	segundo(s)
S/N	se necessário
SC	subcutâneo
SF	solução fisiológica
SG	solução glicosada
SGF	soro glicofisiológico
SL	sublingual
SNE	sonda nasointestinal
SNG	sonda nasogástrica
Sol	solução
SP/Sup	supositório
SS/Susp	suspensão
SY	spray
TB	tubo(s)
TD	transdérmico
TU	tubete(s)
UI	Unidade(s) Internacional(is)
VD	vidros
VO	via oral
VR	via retal
XP	xarope

O que não usar nos registros em prontuários

Não utilizar símbolos, siglas, abreviações ou qualquer tipo de redução de palavras que possam ocasionar mais de uma interpretação, ou sejam incompreensíveis. Abaixo alguns itens inclusos nessas categorias.

Sigla	Significado
<	O sinal de menor pode confundido com a letra "L"
>	O sinal de maior pode ser confundido com o número 7
μ	Este símbolo grego de "micro" não é usual no nosso meio podendo ser confundido com muitas letras
Cc	Para indicar volume de drogas e infusões utilizar "mililitros ou ml" e não centímetro cúbico ou cc
IU	Este símbolo significa unidade internacional porém pode ser confundido com intra-venoso ou com o número 10, dependendo da letra do autor
OD	Pode significar olho direito, ombro direito ou ouvido/orelha direita
OE	Pode significar olho esquerdo, ombro esquerdo ou ouvido/orelha esquerda
U	Este símbolo significa unidade porém pode ser confundido com zero, dependendo da letra do autor

Maternidade (o que não usar)

Sigla	Significado
AB	Aborto
ACM	A Critério Médico
BA	Bom Aspecto
BI	Bomba de Infusão
CO	Corada
CPM	Conforme Prescrição Médica
CU	Cicatriz Umbilical
DPP	Data Provável do Parto
DPP	Deslocamento Prematuro de Placenta
EF	Exame Físico
IC	Incisão Cirúrgica
P	Parto
PC	Parto Cesáreo
PV	Perdas Vaginais
STP	Steri Strip
TP	Trabalho de Parto
TS	Tipagem Sanguínea



ALBERT EINSTEIN

SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA BRASILEIRA

HOSPITAL • ENSINO E PESQUISA • RESPONSABILIDADE SOCIAL



ENTRE EM CONTATO

Entre em contato com a gente. Qualquer dúvida, sugestões ou reclamações envie um e-mail para informativoeinstein@einstein.br, ligue para (11) 3747-0463 ou escreva para Informativo Einstein – Av. Albert Einstein, 627 – Departamento de Marketing – CEP 05651-901 – São Paulo – SP.